








**CLAVES PARA EL GÉNERO
LACTARIUS ATENDIENDO
A SU LÁTEX Y SU HÁBITAT**

CLAVES PARA EL GENERO LACTARIUS ATENDIENDO A SU LÁTEX Y SU HÁBITAT.

Látex transparente o acuoso 13-15
Látex Blanco 16-23
Látex Amarillo. 24-27
Látex Naranja o Rojo.  28-30
Látex blanco que vira a Violeta. 31-33
Látex Rosa. 34-35

13- HÁBITAT. LÁTEX ACUOSO O TRANSPARENTE

- a) En robledales o encinares.....14
- b) En bosques de ribera.....15

14- EN ROBLEDALES O ENCINARES

- a) Sombrero de color anaranjado con “pelillos” blancos en la base del pie.....*Lactarius atlanticus.*
- b) Sombrero de color oscuro con “umbón o pezón”.....*Lactarius subumbonatus.*

15- EN BOSQUES DE RIBERA

- a) Sombrero muy pequeño ≤ 2 Cm, de color oscuro En bordes de rios alisedas).....*Lactarius obscuratus.*

16- HÁBITAT. LÁTEX BLANCO

- a) En Abedulares.....17
- b) En Avellanares.....18
- c) En Hayedos.....19
- d) En bosques de Ribera.....20
- e) En Jarales.....21
- f) En Pinares.....22
- g) En Robledales o Encinares.....23

17- ○ EN ABEDULARES.

- a) Sombrero con tono verde oliváceo.....*Lactarius turpis.*
b) Sombrero rosa pálido con “olor a coco”.....*Lactarius glycosmus.*

18- ○ EN AVELLANARES.

- a) Sombrero ondulado, zonado con látex abundante y muy
picante.....*Lactarius pyrogalus.*

19- ○ EN HAYEDOS.

- a) Con manchas redondas y oscuras hacia el borde del sombrero.....
.....*Lactarius blennius.*

20- ○ EN BOSQUES DE RIBERA.

- a) Sombrero zonado y borde pubescente, bajo abedules, se puede confundir con el
niscalco, Tóxico.....*Lactarius torminosus.*
b) Sombrero de color blanquecino con borde pubescente, bajo abedules y
chopos.....*Lactarius pubescens.*
c) Sombrero blanco de gran tamaño con láminas rosáceas, bajo chopos.....
.....*Lactarius controversus.*



21- ○ EN JARALES.

- a) Sombrero pequeño, rosado, no zonado y con borde
pubescente.....*Lactarius tesquorum.*

22- ○ EN PINARES.

- a) Sombrero y pie anaranjado.....*Lactarius aurantiacus.*
b) Látex muy abundante, con “olor como a sardinas”.....*Lactarius volemus.*
c) Sombrero blanco de gran tamaño.....*Lactarius vellereus.*
d) Sombrero con umbón, látex abundante, “olor a achicoria”.....*Lactarius rufus.*
e) Tamaño muy pequeño, crece sobre sphagnun (musgos).....*Lactarius sphagneti.*


23-  EN ROBLEDALES Y ENCINARES.

- a) Pequeños, necesitan suelos muy húmedos.....*Lactarius lacunarum.*
- b) Olor a geranio.....*Lactarius decipiens.*
- c) Con banda anular rojiza en el pie bajo las láminas..... *Lactarius rubrocinctus.*
- d) Sombrero grande poco zonado con margen incurvado y bajo encinas..... *Lactarius zugazae.*
- e) Sombrero de color blanco, látex que vira al verde *Lactarius glaucescens.*
- f) Cutícula arrugada sobre todo por los bordes del sombrero. Buen comestible.....
.....*Lactarius rugatus.*
- g) Látex blanco que se vuelve pardo rojizo *Lactarius azonites.*
- h) Sombrero con umbón, látex abundante, “olor a achicoria” *Lactarius rufus.*

24-  HÁBITAT. LÁTEX AMARILLO

- a) En Robledales o Encinares.....25
- b) En Abetales.....26
- c) En Abedulares.....27

25-  EN ROBLEDALES O ENCINARES

- a) Con apariencia de niscallo, con látex blanco que se vuelve amarillo azufre. *Lactarius chrysorreus.*

26-  EN ABETALES

- a) Sombrero amarillo anaranjado, borde pubescente, pie escrobiculado.....
.....*Lactarius scrobiculatus.*

27-  EN ABEDULARES

- a) Sombrero amarillo, olor a limón..... *Lactarius citriolens.*


28-  HÁBITAT. LÁTEX NARANJA O ROJO. Comestibles todos.

- a) En Pinares.....29
- b) En Cedros.....30

29-  EN PINARES.

- a) Sombrero, pie y láminas naranjas con látex naranja..... *Lactarius deliciosus.*
- b) Sombrero anaranjado parecido al níscolo, látex naranja.....*Lactarius quieticolor.*
- b1) Látex azul en el sombrero..... *Lactarius quieticolor var. Hemicyaneus.*
- c) Carne naranja, látex naranja que vira al rojo vinoso con el tiempo.....
..... *Lactarius semisanguifluus.*
- d) Carne y látex rojo color sangre..... *Lactarius sanguifluus.*

30-  EN CEDROS.

- a) Aspecto de níscolo, látex naranja que se torna pardo rojizo. 
..... *Lactarius-salmonicolor.*

31-  HÁBITAT. LÁTEX BLANCO QUE TORNA A VIOLETA

- a) En bosques de ribera.....32
- b) En Jarales.....33

32-  EN BOSQUES DE RIBERA

- a) Sombrero y pie con tonos lila, látex blanco que vira a violeta intensamente
..... *Lactarius uvidus.*
- b) Sombrero anaranjado zonado, tamaño pequeño y en zonas húmedas....
..... *Lactarius spinosulus.*

33-  EN JARALES

- a) Sombrero oscuro, con látex blanco que vira a violeta..... *Lactarius cistophilus.*

34-  HÁBITAT. LÁTEX ROSA.

35-  EN HAYEDOS.

- a) Sombrero de color pardo, látex rosa, pica muchísimo..... *Lactarius acris.*

Lactarius atlanticus		Lactarius subumbonatus	
Lactarius obscuratus		Lactarius turpis	
Lactarius pyrogalus		Lactarius blennius	
Lactarius torminosus		Lactarius pubescens	
Lactarius controversus		Lactarius tesquorum	
Lactarius glyciosmus		Lactarius aurantiaucus	
Lactarius volemus		Lactarius vellereus	
Lactarius rufus		Lactarius sphagneti	
Lactarius lacunarum		Lactarius decipiens	
Lactarius rubrocinctus		Lactarius zugazae	
Lactarius glaucescens		Lactarius rugatus	
Lactarius azonites		Lactarius chrysorrheus	
Lactarius scrobiculatus		Lactarius citriolens	
Lactarius deliciosus		Lactarius quieticolor	
Lactarius semisanglifuus		Lactarius sanguifluus	
Lactarius salmonicolor		Lactarius uvidus	
Lactarius spinosulus		Lactarius-cistophilus	
Lactarius acris			